



Informação dos Serviços Farmacêuticos

Ticolquicosido, 4mg, comprimidos

Indicações terapêuticas	<p>Relaxante muscular de ação central. Indicado no tratamento de contracturas dolorosas, durante:</p> <ul style="list-style-type: none">• Síndrome dolorosa vertebral,• Síndromes radiculares: cervicobraquialgia, lombocitalgia, cruralgia,• Rigidez dolorosa por fratura, entorse ou luxação.
Como tomar	<ul style="list-style-type: none">• Tomar sempre de acordo com as indicações do médico.• 3 a 6 comprimidos por dia, após as refeições principais.
Em caso de esquecimento de uma dose	<p>Deve tomar assim que se lembrar, em vez de a tomar na altura da dose seguinte, seguindo depois o esquema habitual.</p> <p>Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.</p>
Efeitos adversos	<ul style="list-style-type: none">• Diarreia (neste caso, recomenda-se diminuição da posologia)• Náuseas e vômitos• Gastralgia• Hipotensão• Agitação• Sonolência• Eritema cutâneo• Dermatite
Interações	<p>Não são conhecidas interações medicamentosas.</p>
Precauções	<p>Contém Lactose.</p>

Data 28/6/2013.....Serviços Farmacêuticos